

Vogelgriepsurveillance bij wilde zoogdieren

- Hoe kunnen beheerders helpen? -

Waarom vogelgriepsurveillance bij wilde zoogdieren?

Het monitoren van de hoogpathogene vogelgriepvirusvarianten (HPAIV) in wilde zoogdieren is van groot belang. Zo kunnen we volgen of het virus zich aanpast tot een variant die zich bijvoorbeeld makkelijker kan verspreiden tussen zoogdieren, of die ziekmakender is.

Wanneer extra waakzaam zijn, en waar dan melden?

Er zijn verschillende hoogpathogene vogelgriepsituaties en gastheerkenmerken waarbij de kans dat een zoogdier besmet raakt met vogelgriep groter is dan normaal.

Situaties

Locatie met **verhoogde vogelsterfte** door HPAIV



Rondom een **besmet bedrijf**



Bij **vogelaggregatie** waar HPAIV voorkomt in vogels



Gastheerkenmerken


Is **carnivoor of aaseter** doordat ze besmette prooien eten



Leeft in **aquatische omgeving** waar HPAIV voorkomt in water



Leeftijd Alle leeftijden zijn gevoelig, zeker ook jonge zoogdieren



Dood gevonden



Afwijkend neurologisch gedrag vóór de dood



Meld hier een **dood zoogdier**



Meld het dode zoogdier [via het formulier](#) op onze website en geef aan of het dier in een van deze situaties is gevonden



Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Bel het landelijk meldpunt dierziekten: (045) 546 31 88



Funded by the European Union

Zonder jullie is dit niet mogelijk, bedankt!